



НЕ ПАРКУЙ

РЕБЕНКА

***ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ РЕБЕНКА
В МАШИНЕ ОДНОГО ?***

1. Ребенок может получить тепловой удар или наоборот переохлаждение;
2. Машина может удушить: ребенок может запутаться в ремнях безопасности или попасть под стеклоподъемник;
3. В машине может произойти возгорание;
4. Машина может утонуть;
5. Эвакуатор вместе с машиной заберет и ребенка;
6. Автомобиль с малышом могут протаранить;
7. Машину могут угнать вместе с ребенком;
8. Ребенок может сам завести машину и тронуться с места.

Безопасность детей - в руках взрослых!

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР - ПОРАЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ВСЛЕДСТВИЕ СИЛЬНОГО ПЕРЕГРЕВА ГОЛОВЫ ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ. В результате солнечного удара происходят значительные изменения в обмене веществ, что приводит к дефициту кислорода в тканях, от которого страдает в первую очередь ЦНС, может развиться отек мозга, а также нарушаются функции жизненно важных органов и систем.

Солнечный удар у детей развивается быстрее, чем у более закаленных взрослых, так как механизмы терморегуляции и метаболизма у малышей еще не сформированы в полной мере. Кроме того, кожные покровы головы у детей более уязвимы, чувствительны к воздействию тепла и не обладают достаточными защитными свойствами.

Что предрасполагает к солнечному удару?

Предрасполагают к солнечному удару у детей, наряду с повышенной температурой окружающей среды и прямым воздействием солнечных лучей, высокая влажность; безветренная погода; не соответствующая погоде одежда ребенка; нарушение механизмов терморегуляции, особенно у детей раннего возраста; недостаточный или неправильный питьевой режим в условиях жары; различные заболевания центральной нервной системы.



Признаки солнечного удара у детей

Признаки солнечного удара у детей проявляются очень быстро и могут быть такими:

- ♦ **Внезапная вялость, раздражительность или сонливость. Ребенок часто зевает, стремится прилечь.**
- ♦ **Сильное покраснение лица.**
- ♦ **Головная боль, повышенная температура.**
- ♦ **Капли пота на лица (испарина).**
- ♦ **Тошнота и рвота.**
- ♦ **Отсутствие реакции на раздражители (отсутствие рефлексов).**
- ♦ **Обезвоживание.**

Солнечный удар у детей может закончиться угрожающими жизни последствиями – потерей сознания, замедлением пульса, асфиксией, сердечной недостаточностью.



Первая помощь при солнечном ударе у ребенка

- ♦ Немедленно перенести ребенка в прохладное помещение, в крайнем случае – в тень.



- ♦ Положить ребенка, придать горизонтальное положение, голову повернуть набок.

- ♦ Полностью накрыть тканью голову. Ткань, пеленка, повязка должны быть смочены в прохладной воде. Вода должна быть комнатной температуры, это важно. Не следует пользоваться льдом, так как он является контрастом в смысле температурного воздействия и может спровоцировать кровоизлияние.



- ♦ Если ребенок в сознании, ему каждые полчаса необходимо давать пить охлажденную очищенную или кипяченую воду.



- ♦ Если в течение получаса состояние ребенка не улучшается, необходимо вызвать скорую помощь.

- ♦ **Обратите внимание, если от удара пострадал ребенок в возрасте от рождения до 3-х лет, врача нужно вызвать немедленно.**

НИКОГДА НЕ ОСТАВЛЯЙ РЕБЕНКА В МАШИНЕ ОДНОГО!



Припаркованную машину
могут протаранить



Автомобиль может быть
эвакуирован и даже угнан
вместе с ребенком



Малыш может
переохладиться или,
наоборот, перегреться



Ребенок может запутаться
в ремнях безопасности
и задохнуться

**ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ РЕБЕНКА, ОСТАВЛЕННОГО
В АВТОМОБИЛЕ БЕЗ ПРИСМОТРА, ЗВОНИТЕ 112**

непаркуйребенка.рф